



blijft heeft deze Nematode E de voorkeur boven Nematode K vanwege zijn iets snellere werking. Het gebruik en dosering van beide typen nematoden is gelijk.

## **Het gebruik van Nematode E / Nematode K**

### **Inhoud**

90% nematoden

10% inerte ingrediënten en water

### **Verpakkingseenheid**

Verkrijgbaar in kleinverpakking van 50 miljoen aaltjes en grootverpakking van 250 miljoen aaltjes.

### **Bereiding spuitvloeistof**

- Doe de inhoud van de verpakking in een emmer met 10 liter water ( $\pm 18^{\circ}\text{C}$ ).
- Roer de oplossing goed door.
- Giet vervolgens de oplossing in de spuittank. Vul de spuittank af tot de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof.
- Geopende verpakkingen niet bewaren.

### **Toepassing**

- Toepassing mogelijk met gieter, regenleiding, rugspuit, motorspuit.
- Verwijder alle fijne filters om verstopping te voorkomen (kleiner dan 1 mm)
- Beregen gewas licht voor toepassing en na toepassing naregenen.
- Direct verspuiten.
- Tijdens de bespuiting de oplossing in beweging houden om bezinken van de aaltjes te voorkomen.
- Bij gebruik van een motorspuit maximaal 20 bar hanteren.
- Hoeveelheid spuitvloeistof is afhankelijk van de manier van toepassen.
- Spuitvloeistof gelijkmatig verdelen op grondoppervlak.
- De spuitvloeistof kan niet bewaard worden.

### **Dosering**

<i>Nematoden</i>	<i>Dosering</i>	<i>Frequentie</i>	<i>Interval</i>	<i>m<sup>2</sup> per verp. 250 miljoen en liters spuitvloeistof</i>	<i>m<sup>2</sup> per verp. 50 miljoen en liters spuitvloeistof</i>
<i>Zware aantasting</i>	<i>1.000.000/m<sup>2</sup></i>	<i>2 – 3x</i>	<i>7 dagen</i>	<i>250m<sup>2</sup> in 500 liter</i>	<i>50m<sup>2</sup> in 100 liter</i>
<i>Lichte aantasting</i>	<i>500.000/m<sup>2</sup></i>	<i>2 – 3x</i>	<i>7 dagen</i>	<i>500m<sup>2</sup> in 1000 liter</i>	<i>100m<sup>2</sup> in 200 liter</i>

### **Aanbevelingen**

- De bodem moet voor toepassing vochtig zijn.
- Niet toepassen bij zonnig weer.
- Bodemtemperatuur van minimaal 14 °C (Nematode E) of minimaal 5°C (Nematode K) en maximaal 30°C (Nematode E en Nematode K)
- Gebruik de aangegeven dosering.
- Na toepassing moet de grond enkele dagen vochtig blijven.

### **Opslag**

- Bewaren in de koelkast, tussen 2°C en 6°C.
- Niet invriezen.
- Zie verpakking voor de uiterste gebruiksdatum.
- Zorg voor goede ventilatie rondom de verpakking.